

GEBRAUCHSINFORMATION

Was ist in Feminella Vagi C® enthalten?

1 Vaginaltablette enthält 250 mg Vitamin C (Ascorbinsäure), Silikonharz, Lactose-Monohydrat, Hydroxylpropylmethylcellulose, Magnesiumstearat.

Wie wirkt Feminella Vagi C®?

Feminella Vagi C® Vaginaltabletten schützen auf natürliche Weise die Mikroflora der Scheide, indem sie für die Aufrechterhaltung des pH-Werts im physiologischen Bereich sorgen. Feminella Vagi C® Vaginaltabletten helfen in der Behandlung und Prävention der bakteriellen Vaginose. Sie stellen rasch das normale Scheidenmilieu wieder her und verhindern so das Wachstum unerwünschter Keime, welche für die Entstehung der bakteriellen Vaginose, z.B. auch in der Schwangerschaft, verantwortlich sind. Feminella Vaginalzäpfchen sind sehr gut geeignet zur Anwendung bei immer wiederkehrenden Infektionen oder als Nachbehandlung nach einer Antibiotikatherapie.

Wie dosieren Sie Feminella Vagi C®?

1 x täglich, am besten abends vor dem Schlafengehen. Es wird empfohlen, die Anwendung über 6 Tage durchzuführen, um eine rasche Normalisierung der Scheidenflora zu erreichen. Wenn notwendig, kann die Anwendung verlängert oder wiederholt werden.

Wie wenden Sie Feminella Vagi C® an?

Führen Sie Feminella Vagi C® Vaginaltabletten tief in die Scheide ein. Feminella Vagi C® Vaginaltabletten schützen die Mikroflora der Scheide, indem sie Vitamin C über Stunden hinweg freisetzen, dauernde Ansäuerung garantieren und so den pH-Wert der Scheide schnell normalisieren.

Wann dürfen Sie Feminella Vagi C® nicht anwenden?

Feminella Vagi C® Vaginaltabletten dürfen bei Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden. Feminella Vaginaltabletten können in Schwangerschaft und Stillzeit angewendet werden.

Was müssen Sie ausserdem beachten?

Nicht schlucken. Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Welche Nebenwirkungen kann Feminella Vagi C® haben?

Selten kann ein brennendes oder juckendes Gefühl in der Scheide auftreten. In einzelnen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. In diesen Fällen ist die Anwendung zu beenden.

Welche Wechselwirkungen kann Feminella Vagi C® verursachen?

Vitamin C kann einen Einfluß auf die Bestimmung verschiedener Laborwerte (Harnzucker, Laktat-Dehydrogenase, Transaminasen, Bilirubin) haben. Vitamin C kann die Wirkung von Mitteln zur Blutverdünnung verringern.

HERSTELLER: Polichem S.A., Via Senago 42/D-6912 Lugano-Pazzallo, Schweiz

BEVOLLMÄCHTIGTER: Bioselecta s.r.l. Mailand, Italien

VERTRIEB: CSC Pharmaceuticals Handels GmbH, 1190 Wien

Kühl und trocken aufbewahren.