

## **Gebrauchsinformation: Information für den Anwender**

### **Cefavertigo Tabletten**

Wirkstoffe: Anamirta cocculus D4, Conium maculatum D4, Petroleum rectificatum D8, Strychnos nux-vomica D4

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. [Siehe Abschnitt 4.](#)
- Wenn Sie sich nach 7 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Cefavertigo und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Cefavertigo beachten?
3. Wie ist Cefavertigo einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Cefavertigo aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Cefavertigo und wofür wird es angewendet?**

Cefavertigo ist ein homöopathisches Arzneimittel.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Schwindelgefühl unterschiedlicher Ursache.

Die Anwendung dieses homöopathischen Arzneimittels in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

#### **2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Cefavertigo beachten?**

**Cefavertigo darf nicht eingenommen werden,**

wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Wenn die Beschwerden trotz Behandlung länger als 7 Tage anhalten oder bei schwerem Krankheitsgefühl dann ist eine ärztliche Beratung dringend erforderlich.

Bei Einnahme homöopathischer Arzneimittel können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstreaktion). Das Arzneimittel ist dann abzusetzen. Nach

Abklingen der Erstreaktion kann das Arzneimittel wieder eingenommen werden. Bei neuerlicher Verstärkung der Beschwerden ist das Mittel abzusetzen.

Homöopathische Arzneimittel können bei dafür empfänglichen Personen Arzneimittel-Prüfungssymptome (neue Beschwerden) hervorrufen. Beim Auftreten neuer Beschwerden soll das Arzneimittel abgesetzt werden.

#### **Einnahme von Cefavertigo zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind nicht bekannt.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel einzunehmen.

#### **Einnahme von Cevavertigo zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol**

In der Homöopathie ist bekannt, dass die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel wie z. B. Kaffee, Zigaretten, Alkohol ungünstig beeinflusst werden kann.

#### **Schwangerschaft und Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit**

Da keine ausreichenden Daten vorliegen, kann die Anwendung während der Schwangerschaft und in der Stillzeit nicht empfohlen werden.

Zur Beeinflussung der Zeugungs- und Gebärfähigkeit liegen keine Daten vor.

#### **Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Cefavertigo hat keinen Einfluss auf die Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen.

#### **Cefavertigo enthält Lactose (Milchzucker)**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose (Milchzucker). Bitte nehmen Sie Cefavertigo erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Zuckerunverträglichkeit leiden.

### **3. Wie ist Cefavertigo einzunehmen?**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

#### **Die empfohlene Dosis beträgt**

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette einnehmen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3-mal täglich jeweils 1 Tablette einnehmen.

Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

Cefavertigo Tabletten sind nicht zur Anwendung an Kindern unter 12 Jahren bestimmt, da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen.

#### **Art der Anwendung:**

Die Tabletten kann man im Mund zergehen lassen oder auch im Ganzen mit etwas Flüssigkeit (z.B. Wasser) schlucken. Die Einnahme ist unabhängig von den Mahlzeiten.

#### **Dauer der Anwendung:**

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

**Wenn Sie eine größere Menge Cefavertigo eingenommen haben, als Sie sollten:**

Es wurden keine Fälle von Überdosierung berichtet.

**Wenn Sie die Einnahme von Cefavertigo vergessen haben:**

Nehmen Sie nicht die doppelte Menge ein, sondern fahren Sie mit der Einnahme, wie von Ihrem Arzt verordnet oder in der Gebrauchsinformation beschrieben, fort.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

**4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Cefavertigo Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

**Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das nationale Meldesystem anzeigen:

Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 WIEN, ÖSTERREICH, Fax: + 43 (0) 50 555 36207, Website: <http://www.basg.gv.at/>

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

~~Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken.~~

**5. Wie ist Cefavertigo aufzubewahren?**

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

**6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

**Was Cefavertigo enthält:**

Die Wirkstoffe sind:

1 Tablette enthält:

Anamirta cocculus D4	40 mg
Conium maculatum D4	40 mg
Petroleum rectificatum D8	40 mg
Strychnos nux-vomica D4	40 mg

Die sonstigen Bestandteile sind:

Lactose-Monohydrat 259 mg, Magnesiumstearat

**Wie Cefavertigo aussieht und Inhalt der Packung:**

Blisterpackung aus PVC/PVdC-Aluminium mit weißen bis gelbweißen, runden Tabletten im Überkarton.

Packungsgrößen 50, 60 und 100 Tabletten.

**Zulassungsnummer**

3-00574

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Cefak KG, Postfach 1360, D-87403 Kempten, Deutschland

Telefon: 0049 831 57401-0

Telefax: 0049 831 57401-50

e-mail: [cefak@cefak.com](mailto:cefak@cefak.com)

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im ~~Juni~~Oktober 2013.