



Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim · Tel. (0 6251) 10 97-0 · Fax (06251) 3342
<http://www.reckeweg.de>

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Angina-Gastreu® S R 1 jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Angina-Gastreu® S R 1 und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Angina-Gastreu® S R 1 beachten?
3. Wie ist Angina-Gastreu® S R 1 anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Angina-Gastreu® S R 1 aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

Angina-Gastreu® S R 1

Mischung zum Einnehmen

1. WAS IST ANGINA-GASTREU® S R 1 UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Angina-Gastreu® S R 1 ist ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

Anwendungsgebiete:

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören:
Besserung der Beschwerden bei akuten Infekten der oberen Luftwege und des Rachenraumes.

Hinweis: Bei Anzeichen einer Vereiterung der Rachenmandeln mit erschwelter Mundöffnung, bei Atemnot, bei Fieber oder bei eitrigen Auswurf sowie bei anhaltenden und unklaren Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON ANGINA-GASTREU® S R 1 BEACHTEN?

Angina-Gastreu® S R 1 darf nicht angewendet werden:

- bei Nierenfunktionsstörungen, in der Schwangerschaft und Stillzeit, bei Säuglingen und Kleinkindern auf Grund des Gehaltes an Mercurius sublimatus corrosivus (Quecksilber);
- bei Überempfindlichkeit gegen Chrom;
- bei Schilddrüsenerkrankungen nicht ohne ärztlichen Rat anwenden.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Angina-Gastreu® S R 1 ist erforderlich:

- bei Kindern:

Zur Anwendung des Arzneimittels bei Kindern zwischen dem 6. und dem 12. Lebensjahr liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern in diesem Alter nicht angewendet werden.

- in Schwangerschaft und Stillzeit:

Das Arzneimittel darf nicht angewendet werden.

Bei Anwendung von Angina-Gastreu® S R 1 mit anderen Arzneimitteln:

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Bei Anwendung von Angina-Gastreu® S R 1 zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken:

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Warnhinweise über bestimmte sonstige Bestandteile von Angina-Gastreu® S R 1:

Dieses Arzneimittel enthält 38 Vol.-% Alkohol.

3. WIE IST ANGINA-GASTREU® S R 1 ANZUWENDEN?

Nehmen Sie Angina-Gastreu® S R 1 immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 5 Tropfen einnehmen. Eine über 1 Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen. Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Dauer der Anwendung:

Die Einnahme des Arzneimittels sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als eine Woche erfolgen.

Wenn Sie eine größere Menge von Angina-Gastreu® S R 1 angewendet haben, als Sie sollten:

Bei Einnahme des gesamten Flascheninhaltes dieses Arzneimittels werden bis zu 6,5 g (22 ml) bzw. 15 g (50 ml) Alkohol aufgenommen. Dies kann insbesondere bei Kindern zu Unruhe, Gleichgewichtsstörungen, Benommenheit oder Müdigkeit führen. In diesem Fall sollte Rücksprache mit einem Arzt erfolgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Angina-Gastreu® S R 1 Nebenwirkungen verursachen.

Mögliche Nebenwirkungen:

Wegen des Bestandteils Mercurius (Quecksilber) können gelegentlich allergische Reaktionen auftreten. Nach Anwendung kann Speichelfluss auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. In Einzelfällen können Hautreaktionen auftreten; das Mittel ist dann abzusetzen. Bitte nehmen Sie in diesen Fällen Rücksprache mit Ihrem Therapeuten.

Hinweis: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und medizinischen Rat einholen.

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, die nicht in der Gebrauchsinformation aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

5. WIE IST ANGINA-GASTREU® S R 1 AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Behältnis und dem Umkarton nach „verwendbar bis:“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen :

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Das Arzneimittel Angina-Gastreu® S R 1 enthält:

10 g (entsprechend 10,5 ml) enthalten: Wirkstoffe: Apis Dil. D4 1g, Belladonna Dil. D4 1g, Calcium iodatum Dil. D4 1g, Kalium bichromicum Dil. D4 0,01g, Marum verum Dil. D6 1g, Merc. subl. corr. Dil. D5 1g, Phytolacca Dil. D4 1g. Die Wirkstoffe 2 und 3 sowie 5 und 6 werden gemeinsam über die vorletzte Stufe und die Wirkstoffe 1 bis 3 und 5 bis 7 werden gemeinsam über die letzte Stufe potenziert. Sonstiger Bestandteil: Ethanol 30% (m/m).

1 ml entspricht 19 Tropfen.

Darreichungsform und Packungsgrößen:

Mischung zum Einnehmen in Flaschen mit 22 ml und 50 ml.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

Berliner Ring 32 · D-64625 Bensheim

Tel.: 06251/1097-0 · Fax: 06251/3342 · www.reckeweg.de

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im März 2008.

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6276498.00.00

Handpotenziert nach dem klassischen Mehrglasverfahren Hahnemanns.